



• **Заштите своего ребенка.** Перед тем, как запланировать беременность, посетите врача и убедитесь в том, что ни у вас, ни у вашего партнера нет ИППП. Если вы все же инфицированы, пройдите курс лечения и снова сдайте анализы перед тем, как забеременеть.

Если вы уже беременны, вам необходимо встать на учет в своей женской консультации и пройти полное обследование. В любой период беременности или родов обязательно скажите своему врачу о том, что заметили у себя те или иные симптомы ИППП или подозреваете, что могли заразиться.

Как предотвратить заражение ИППП?

Во время любых видов половых контактов безопаснее пользоваться презервативом. Современные презервативы производятся из латекса, который отличается от обычной резины особой тонкостью и прочностью.

Основные правила пользования презервативом таковы:

- Во время каждого полового контакта необходим новый презерватив.
- Нельзя использовать презерватив, если целостность упаковки нарушена, а также если смазка презерватива высохла или стала липкой на ощупь.
- **ПОКУПАЙТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ ТОЛЬКО В АПТЕКАХ!**
- Внимательно изучите инструкцию по их использованию.
- При правильном и регулярном использовании презерватив защищает от большинства ИППП, включая ВИЧ-инфекцию. Но, даже пользуясь презервативом, нельзя быть полностью застрахованным от заражения: язвочки могут располагаться в области, не прикрытой презервативом.

Лучший способ предотвращения ИППП – сексуальные отношения только с одним партнером, который здоров и верен вам.

Отпечатано по заказу БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» на средства Государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области»

Контактная информация:

БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Адрес: г. Вологда, ул. Щетинина, д.17-а

Телефон регистратуры: 8 (8172) 53-48-44

Телефон отдела профилактики: 8 (8172) 53-52-09

Факс: 8 (8172) 52-20-57


Электронная почта: profvol@list.ru

Интернет-сайт: www.hivlife35.ru

Отпечатано в ООО «Вологодское ПО «Экран»
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 76,
тел.: 8 (8172) 54-13-12, 54-25-13, 54-00-17
ekran-vos@list.ru



ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ



*Всё об
инфекциях,
передаваемых
половым путем*

16+



Вологда
2014

Что такое ИПП и почему о них необходимо знать?

Инфекции, передаваемые половым путем (ИПП), – это заболевания, передаваемые преимущественно во время полового контакта. Как бы неприятно ни было говорить на эту тему, об ИПП необходимо знать, ведь случиться может всякое. Даже если информация об ИПП лично вам не пригодится, вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее и сможете дать полезный совет друзьям и близким.

Как передаются ИПП?

Большинство ИПП передаются посредством полового контакта. Но сифилис, герпетическая, цитомегаловирусная и папилломавирусная инфекции могут передаваться также посредством тесного контакта «кожа к коже» и через поцелуй. Нельзя заразиться ИПП через рукопожатие, в бане или бассейне, борясь за поручни в общественных местах, пользуясь общей с зараженным человеком посудой.

Каковы симптомы ИПП?

• **Наиболее распространными симптомами ИПП у мужчин** являются: белые или желтые выделения из полового органа; боль и жжение при мочеиспускании; язвы, пузьрьки или бородавки на половом органе, коже промежности или на других частях тела.

• **Наиболее распространными симптомами ИПП у женщин** являются: необычные выделения из влагалища с запахом или без него; зуд и раздражение влагалища; язвочки, пузьрьки, бородавки во влагалище или вокруг него, а также различные формы высыпаний на коже промежности и на других частях тела; болезненность при половом акте или мочеиспускании; боль в нижней части живота.

• **Иногда ИПП не сопровождаются никакими симптомами.** Если у вашего партнера ИПП, вы также можете быть заражены, даже если у вас нет никаких симптомов. У людей, зараженных ВИЧ, в течение долгого времени отсутствуют какие-либо проявления болезни.

Каковы последствия ИПП?

ИПП могут вызвать очень серьезные последствия для здоровья. У женщин неизлеченные ИПП могут привести к возникновению хронических заболеваний, бесплодию, внематочной беременности, у мужчин – к бесплодию и различным хроническим заболеваниям (например, простатиту).

Излечимы ли ИПП?

Большинство наиболее распространенных ИПП излечимы. Существуют эффективные средства и методы лечения гонореи, сифилиса, хламидиоза и многих других инфекций. Но несколько ИПП – цитомегаловирусная, герпетическая, папилломавирусная инфекции, гепатит В и ВИЧ-инфекция – неизлечимы. Однако это вовсе не означает, что современная медицина не в состоянии помочь! Если вы своевременно обратитесь к врачу и будете получать соответствующее лечение, то заболевание может длительный период протекать без симптомов. Специалист подскажет, как жить полноценной жизнью, не подвергая риску близких вам людей.



Что вы должны знать, если заразились ИПП?

Если у вас возникло подозрение, что вы заражены ИПП, не впадайте в панику, не занимайтесь самолечением и как можно скорее обратитесь к квалифицированному врачу. Затем:

1. Лечите инфекцию. После установления диагноза выполняйте все предписания врача и продолжайте принимать лекарства, даже если симптомы исчезли и вы почувствовали себя лучше. Если вы не долечитесь, симптомы могут повториться.

2. Не распространяйте ИПП. Исключите половые контакты до тех пор, пока не проведете полный курс лечения. Иначе вы можете передать ИПП своему партнеру и затем повторно заразиться от него. Если половых контактов избежать не удается, каждый раз обязательно используйте презерватив.

3. Помогите своему партнеру в лечении. Порой очень трудно начать разговор об этом, но тем не менее нужно сказать ему о необходимости обращения к врачу и лечения. Можно привести партнера к своему врачу.

4. Вернитесь к врачу, чтобы убедиться в своем окончательном выздоровлении. Если окажется, что вы выздоровели не до конца, вам могут назначить дополнительный курс лечения.

Что вам необходимо знать о влиянии ИПП на протекание беременности, деторождение и грудное вскармливание?

• **Беременная женщина может передать большинство ИПП своим детям во время беременности или родов.** Однако вероятность передачи инфекции будущему ребенку можно резко уменьшить, если вовремя начать лечение. Некоторые заболевания могут передаваться с грудным молоком (например, ВИЧ-инфекция).

• **Наличие ИПП у беременной женщины может причинить серьезный вред плоду.** Неизлеченные инфекции способны привести к выкидуши, преждевременным родам, мертворождению, рождению младенца с дефицитом веса, слепотой, потерей слуха, хроническими респираторными заболеваниями, умственной отсталостью и другими серьезными проблемами в развитии. Неизлеченный сифилис может привести к появлению на свет ребенка с врожденным сифилисом.